

# ОТ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ МОЖЕТ СПАСТИ ПРИВИВКА

**ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ СЧИТАЕТСЯ ХРОНИЧЕСКАЯ ПАПИЛЛОМАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ.**

На сегодняшний день выявлено более 100 различных видов вируса папилломы человека (ВПЧ), но онкологический процесс вызывают не все. Самыми опасными признаны 16 и 18 виды.

**ПРЕДОТВРАТИТЬ ФОРМИРОВАНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ВАКЦИНА.**

Она содержит внешнюю оболочку вируса без генома, поэтому не может спровоцировать развитие онкологии. Её задача – стимулировать выработку устойчивого иммунитета к определённому типу вируса.

## **ФАКТОРЫ РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ ВПЧ:**

- раннее начало половой жизни,
- наличие нескольких половых партнеров,
- заболевания, передающиеся половым путем (хламидийная инфекция, гонорея, трихомониаз, герпес и др.),
- отказ от барьерных методов контрацепции,
- контакты с человеком – носителем ВПЧ, ослабленный иммунитет,
- курение.

## **ПРИВИВКА ОТ ВПЧ – ЭТО ПРОФИЛАКТИКА:**

- рака шейки матки,
- рака вульвы, влагалища, а также наружных половых органов у мужчин,
- генитальных кондилом (бородавок),
- бородавок на коже ладоней, стоп и других частей тела,
- предраковых заболеваний вульвы, шейки матки,
- папилломатоза гортани.

На сегодняшний день вакцинация против ВПЧ официально одобрена почти во всех странах Европы. В Российской Федерации зарегистрированы 2 вакцины: **двуухвалентная** (ВПЧ 16 и 18 типы), **четырехвалентная** (ВПЧ 6, 11, 16 и 18 типы). Рекомендуемый возраст вакцинации – от 9 до 45 лет.

## **СХЕМА ВАКЦИНАЦИИ:**

Для девочек младше 15 лет (оптимально – в возрасте 9–13 лет до начала половой жизни): двукратное введение вакцины с интервалом 6 месяцев (0–6 мес). Для девочек старше 15 лет: трехкратное введение вакцины по схеме 0, 1–2, 6 месяцев.

**Девочкам-подросткам перед вакцинацией нет необходимости в проведении специального гинекологического исследования, ВПЧ-тестирования.**

Прививать нужно не только девочек, но и мальчиков — они являются переносчиками заболевания и также могут пострадать от болезней, вызванных ВПЧ (среди них рак ануса, например).

Прививка от ВПЧ на данный момент не включена в национальный календарь прививок, поэтому не оплачивается за счёт средств ОМС и может быть проведена за счёт личных средств граждан или иных средств, предусмотренных законодательством РФ.

## **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ:**

- повышенная чувствительность к компонентам вакцины,
- развитие тяжёлых системных аллергических реакций или постvakцинальные осложнения на предшествующее введение вакцины против ВПЧ.

## **ВАКЦИНА ПРОТИВ ВПЧ ПОКАЗЫВАЕТ ОЧЕНЬ ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.**

Об этом говорят исследования, которые начались в 1980 гг. Прививка на 90% защищает от развития кондилом и рака. При этом риск инфицирования остальными типами вируса сохраняется (разработана девятивалентная вакцина). Человек должен соблюдать другие меры предосторожности и регулярно проходить профилактические осмотры.

*Листовка создана на основе материалов, предоставленных Лебедевой Татьяной Борисовной, доцентом кафедры акушерства и гинекологии СГМУ, главным внештатным специалистом по репродуктивному здоровью и детской гинекологии минздрава Архангельской области, заместителем главного врача роддома имени К.Н. Самойловой.*



Адрес: 163045, г. Архангельск,  
пр. Ломоносова, 311, 4 этаж



Телефон / факс: 8 (8182) 27-63-50

Телефон горячей линии: 8 (8182) 21-30-36



E-mail: [formylazd@mail.ru](mailto:formylazd@mail.ru)



Сайт: [zdrovie29.ru](http://zdrovie29.ru)



АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР  
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И  
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ



[vk.com/zdrovie\\_29](#)

[ok.ru/zdrovie29](#)

[facebook.com/29health](#)

[twitter.com/zdrovie29.ru](#)

